Exercice 1 du thème Fonctions
Solution proposée par M. Marguerite

Soit a, b, c les longueurs des côtés d'un triangle. Montrer que :

$$a^2(b+c-a) + b^2(c+a-b) + c^2(a+b-c) \leq 3abc.$$

Dans un problème faisant intervenir 3 variables réelles, effectuer une transformation de Ravi (Ravi Vakil mathématicien canadien 1970 -) revient à poser bijectivement :

$$(S) \begin{cases} a = y + z \\ b = z + x. \\ c = x + y \end{cases}$$

$$(S) \Leftrightarrow \begin{cases} a + b - c = 2z \\ b = z + x \\ c = x + y \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} z = \frac{a+b-c}{2} \\ x = b - \frac{a+b-c}{2} \\ y = c - x \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} z = \frac{a+b-c}{2} \\ x = \frac{b+c-a}{2} \\ y = c - \frac{b+c-a}{2} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} z = \frac{a+b-c}{2} \\ x = \frac{b+c-a}{2} \\ y = \frac{a+c-b}{2} \end{cases}.$$

L'inégalité initiale devient :

$$a^2(b+c-a) + b^2(c+a-b) + c^2(a+b-c) \leq 3abc$$

$$\Leftrightarrow 2(y+z)^2x + 2(x+z)^2y + 2(x+y)^2z \leq 3(y+z)(x+z)(x+y)$$

$$\Leftrightarrow 2x(y^2 + 2yz + z^2) + 2y(z^2 + 2zx + x^2) + 2z(x^2 + 2xy + y^2) \leq 3(x^2y + x^2z + y^2x + y^2z + z^2x + z^2y + 2xyz)$$

$$\Leftrightarrow 2(x^2y + x^2z + y^2x + y^2z + z^2x + z^2y) + 12xyz \leq 3(x^2y + x^2z + y^2x + y^2z + z^2x + z^2y) + 6xyz$$

$$\Leftrightarrow 6xyz \leq x^2y + x^2z + y^2x + y^2z + z^2x + z^2y$$

Or, d'après l'inégalité arithmético-géométrique, $(abc)^{\frac{1}{3}} \leq \frac{a+b+c}{3}$ pour tous nombres a, b, c positifs. Donc

- $(x^3y^3z^3)^{\frac{1}{3}} \leq \frac{x^2y+y^2z+z^2x}{3}$ soit $3xyz \leq x^2y + y^2z + z^2x$ (1)

- $(x^3y^3z^3)^{\frac{1}{3}} \leq \frac{x^2z+y^2x+z^2y}{3}$ soit $3xyz \leq x^2z + y^2x + z^2y$ (2)

En ajoutant membre à membre les inégalités (1) et (2) : $6xyz \leq x^2y + x^2z + y^2x + y^2z + z^2x + z^2y$.