



Le calcul vectoriel est un outil fort utile pour les démonstrations en géométrie :

- Le milieu I d'un segment  $[AB]$  est caractérisé par l'une des égalités vectorielles suivantes :  $\overrightarrow{AB} = 2\overrightarrow{AI}$  ou  $\overrightarrow{AI} = \overrightarrow{IB}$  ou, pour un point M du plan,  $\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} = 2\overrightarrow{MI}$ .
- La colinéarité de deux vecteurs non nuls traduit le parallélisme de deux droites ou l'alignement de trois points.
- L'égalité de deux vecteurs se traduit par une configuration de parallélogramme.
- La relation de Chasles facilite les calculs.

### Exercice 1

Soit ABCD un parallélogramme. On note I le milieu du segment  $[AB]$  et on considère le point E du segment  $[ID]$  tel que  $IE = \frac{1}{3}ID$ .

Montrer que les points A, E et C sont alignés.


### Exercice 2 – le trapèze complet

Dans la figure ci-contre ABCD est un trapèze convexe de bases  $[AB]$  et  $[DC]$ .

Les droites  $(AD)$  et  $(BC)$  se coupent en un point E.

I et J désignent les milieux respectifs de  $[AB]$  et  $[CD]$ .

F est le point d'intersection des droites  $(AC)$  et  $(BD)$ .



- a.** Expliquez pourquoi il existe un réel  $a$  tel que  $\overrightarrow{EA} = a\overrightarrow{ED}$ . Préciser le signe de  $a$ .

**b.** Montrer que  $\overrightarrow{EB} = a\overrightarrow{EC}$  et  $\overrightarrow{EI} = a\overrightarrow{EJ}$ .
- a.** Expliquez pourquoi il existe un réel  $b$  tel que  $\overrightarrow{FA} = b\overrightarrow{CF}$ . Préciser le signe de  $b$ .

**b.** Montrer que  $\overrightarrow{FB} = b\overrightarrow{DF}$  et  $\overrightarrow{FI} = b\overrightarrow{JF}$ .
- Que peut-on dire des points E, F, I et J ?

### Exercice 3

Un repère  $(O, \vec{i}, \vec{j})$  est orthonormé lorsque les points I et J définis par les vecteurs  $\overrightarrow{OI} = \vec{i}$  et  $\overrightarrow{OJ} = \vec{j}$  sont tels que  $OI = OJ$  et les droites  $(OI)$  et  $(OJ)$  sont perpendiculaires.

Définition : on dit que deux vecteurs  $\vec{u}$  et  $\vec{v}$  sont colinéaires s'il existe un réel  $k$  tel que  $\vec{u} = k\vec{v}$  ou  $\vec{v} = k\vec{u}$ .

Théorème : dans le plan muni d'un repère orthonormé, les vecteurs  $\vec{u} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$  et  $\vec{v} \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix}$  sont colinéaires si et seulement si  $xy' - x'y = 0$ .

Définition : dans le plan muni d'un repère orthonormé, le déterminant du couple de vecteurs  $(\vec{u}, \vec{v})$  où  $\vec{u}$  et  $\vec{v}$  sont les vecteurs de coordonnées respectives  $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$  et  $\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix}$  est le nombre  $\det(\vec{u}, \vec{v}) = xy' - x'y$ .

L'introduction d'un repère dans un exercice de géométrie permet de démontrer des alignements en s'appuyant sur la condition de colinéarité de deux vecteurs par le déterminant.

#### 1. Démonstration du théorème

- Démontrer que si les vecteurs  $\vec{u} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$  et  $\vec{v} \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix}$  sont colinéaires alors  $xy' - x'y = 0$ .
- Démontrer que les vecteurs  $\vec{u} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$  et  $\vec{v} \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix}$  sont tels que  $xy' - x'y = 0$  alors ils sont colinéaires.  
(on pourra traiter à part le cas où l'un au moins des vecteurs est nul)

## 2. Application

Soit ABCD un rectangle et M un point du segment [BD]. On considère le symétrique N du point C par rapport à M. La parallèle à (AD) passant par N coupe (AB) en P et la parallèle à (AB) passant par N coupe (AD) en Q.

L'objectif est de montrer que les points M, P et Q sont alignés. Pour cela on se place dans le repère orthonormal  $(A, \frac{1}{a}\overrightarrow{AB}, \frac{1}{b}\overrightarrow{AD})$  où  $AB = a$  et  $AD = b$ .

- Précisez les coordonnées des points A, B, C et D dans ce repère.
- Justifier l'existence d'un réel  $k$  tel que  $\overrightarrow{BM} = k\overrightarrow{BD}$ . Déterminer les coordonnées du point M puis celles des points N, P et Q en fonction de  $k$ .
- Conclure.

## Exercice 4

**Définition :** un point  $M'$  est le symétrique d'un point M par rapport à une droite  $\mathcal{D}$  lorsqu'il est sur cette droite ou lorsque la droite  $\mathcal{D}$  est la médiatrice du segment  $[MM']$ .

**Définition :** la courbe représentative  $C_f$  d'une fonction  $f$  est l'ensemble des points  $M(x, f(x))$  où  $x$  prend toutes les valeurs pour lesquelles  $f(x)$  existe (ensemble de définition de la fonction)

Soit  $f$  et  $g$  les fonctions définies sur  $[0, +\infty[$  par  $f(x) = x^2$  et  $g(x) = \sqrt{x}$ . On note  $C_f$  et  $C_g$  les courbes représentatives respectives de  $f$  et  $g$  dans un repère orthonormal  $(O, \vec{i}, \vec{j})$

- Tracer  $C_f$  et  $C_g$  et déterminer leurs points d'intersection. On notera A celui d'abscisse strictement positive.
- Soit  $x$  un réel positif ou nul, M le point de  $C_f$  d'abscisse  $x$  et N le point de  $C_g$  d'abscisse  $x^2$ . Montrer que les points M et N sont symétriques par rapport à la droite (OA).
- Que peut-on en déduire pour les courbes  $C_f$  et  $C_g$  ?

## Exercice 5

**Définition :** on dit qu'une fonction  $f$  admet un minimum (respectivement un maximum) en  $a$  sur un ensemble  $D$  lorsque pour tout réel  $x$  de  $D$ ,  $f(x) \geq f(a)$  (respectivement  $f(x) \leq f(a)$ ). Le nombre  $f(a)$  est alors le minimum (respectivement maximum) de  $f$  sur  $D$ .

**Définition :** une fonction  $f$  est croissante (respectivement décroissante) sur un intervalle  $I$  lorsque pour tous réels  $a$  et  $b$  de  $I$ , si  $a \leq b$  alors  $f(a) \leq f(b)$  (respectivement  $f(a) \geq f(b)$ ).

On rappelle que pour comparer deux nombres, on peut étudier le signe de la différence de ces deux nombres.

Soit ABC un triangle rectangle en A tel que  $AB = 4$  et  $AC = 3$ . Soit M un point du segment [AB], N le point d'intersection de la parallèle à (AC) passant par M avec la droite (BC) et P le point d'intersection de la parallèle à (AB) passant par N avec la droite (AC). On note  $AM = x$ .

- Exprimer la distance MN en fonction de  $x$ . Dans quel intervalle varie le nombre  $x$  ?
- Montrer que si  $A(x)$  désigne l'aire  $A(x)$  du quadrilatère AMNP en fonction de  $x$ , alors  $A(x) = \frac{3}{4}x(4 - x)$ .
  - Montrer que cette aire est maximale pour  $x = 2$  et déterminer ce maximum.
- Etudier les variations, sur  $[0,4]$ , de la fonction qui à  $x$  associe le périmètre  $P(x)$  du quadrilatère AMNP. Quelle son maximum ?

## Exercice 6

Pour montrer que deux nombres  $A$  et  $B$  sont égaux, on peut montrer que  $A - B = 0$ .

Pour tous nombres réels  $a, b, c$  et  $d$  tels que  $b \neq 0$  et  $d \neq 0$ ,  $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$  équivaut à  $ad = bc$ .

On considère quatre nombres réels non nuls tels que  $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$ .

Démontrer que : (i)  $\frac{a^2+c^2}{b^2+d^2} = \frac{ac}{bd}$  (ii)  $\frac{a}{c} = \frac{b}{d} = \frac{3a-2b}{3c-2d}$

(On se place dans la situation où tous ces quotients sont bien définis.)